

Pentamidine isethionate



Marca comercial: Pentam 300, Nebupent, Pentacarinat

El isetionato de pentamidina, conocido también como Pentam 300 ó Nebupent, es un tipo de medicamento llamado antiprotozoario. Estos productos ayudan al cuerpo a combatir las infecciones causadas por protozoarios, que son microorganismos microscópicos causantes de enfermedad.

Formas de empleo

El isetionato de pentamidina fue autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos el 15 de junio de 1989 para uso en el tratamiento de la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (antiguamente *Pneumocystis carinii*) (PCP), una infección oportunista que afecta a las personas con infección por el VIH/SIDA. Por lo general, se emplea pentamidina solo cuando los pacientes con PCP no pueden tolerar el tratamiento de primera línea con sulfametoxazol-trimetoprima.

Presentación/Administración

Se administra en solución inhalable o en inyección intramuscular o intravenosa.

Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier afección de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, el isetionato de pentamidina puede causar algunos efectos adversos. Entre sus efectos secundarios adversos cabe citar somnolencia; enrojecimiento y sequedad de la piel; aliento con olor a frutas; sed intensa; aumento de la micción; inapetencia; valores elevados en los exámenes de la función hepática; ansiedad; escalofrío; sudor frío; enfriamiento y palidez de la piel; dolor de cabeza; hambre intensa; náusea; nerviosismo; temblor; visión borrosa; confusión; mareo; desmayo; cansancio o debilidad poco comunes; dolor de garganta o fiebre; micción menos frecuente; hemorragia o hematomas poco comunes; pulso rápido o irregular; anomalías en el electrocardiograma (ECG); taquicardia ventricular conocida como torsades de pointes (latido cardíaco anormal); erupción cutánea; enrojecimiento; prurito; fiebre; o dolor, enrojecimiento o endurecimiento del sitio de la inyección. Los

pacientes deben informar al médico sobre cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo del medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves de este medicamento están náusea o vómito, inapetencia, diarrea y sabor metálico desagradable. Los pacientes deben informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

Interacción con otros medicamentos

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Pentamidine isethionate, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Pentamidine isethionate AND HIV Infections.

Fabricantes

Pentamidine isethionate
Fujisawa Healthcare Inc
Parkway Center North / 3 Parkway North
Deerfield, IL 60015-2548
(800) 727-7003

Pentam 300
Fujisawa Healthcare Inc
Parkway Center North / 3 Parkway North
Deerfield, IL 60015-2548
(800) 727-7003

Pentamidine isethionate



Fabricantes (cont.)

Nebupent

Fujisawa Healthcare Inc
Parkway Center North / 3 Parkway North
Deerfield, IL 60015-2548
(800) 727-7003

Pentacarinat

Rhone - Poulenc Rorer
500 Arcola Road
Collegeville, PA 19426
(800) 340-7502

Para más información

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: http://aidsinfo.nih.gov/live_help
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este